

藥品查詢系統操作手冊

制定日期：2014 年 2 月
制訂單位：藥學部、臨資中心

藥品查詢手冊網址：<http://www3.vghtc.gov.tw:8080/pharmacyHandbook/>

點選後會自動判定使用電腦版或者手機版。

電腦版網址：<http://www3.vghtc.gov.tw:8080/pharmacyHandbook/handbook.html>

手機版網址：http://www3.vghtc.gov.tw:8080/pharmacyHandbook/handbook_m.html

連結路徑：

連結路徑：醫院網站 → 藥物諮詢 → 新版藥品手冊查詢

院內公務電腦桌面：



使用環境：

1. 電腦版須於 IE8(含)以上網頁瀏覽器、Google chrome 或 Firefox 使用。
2. 手機版建議以 Google chrome 使用。

系統新增功能：

1. 多重查詢功能: 可以適應症、藥理分類、ATC、藥碼、學名、中英文商品名查詢。
2. 可以快速以連結查詢同藥理/ATC 藥品。
3. 與 HIS 藥品資料同步，HIS 系統藥品更新時會同步更新藥典資料。
4. 可連接到外部資料庫或健保署藥品資料。
5. 有警示類別(包含管制藥、缺藥、ADR 藥品、抗生素和化學藥物)。
6. 查詢介面滑鼠置於藥名或警示標籤上面會有說明訊息。
7. 可由藥品外觀查詢口服藥品。

查詢方式：

1. 於系統中輸入關鍵字並且選擇要搜尋的類別後點擊搜尋即可搜尋。
2. 點選藥品名稱可以進入藥品詳細資料。
3. 點選藥理會查詢同藥理資料。
4. 點選健保碼會連到健保局資料庫。(電腦版適用)
5. 查詢介面的「劑型」、「藥品學名」可以對查詢結果作排序。(電腦版適用)

電腦版畫面：

臺中藥總藥品手冊查詢系統

由藥品資料查詢 由藥品外觀查詢 非本院健保藥品查詢

請輸入藥品查詢關鍵字 N.S.A.I.D.s

查詢類別 藥碼 學名 商品名 藥理 適應症 ATC

搜尋類別

共 24 筆資料

藥品學名 中文商品名	劑型	成分藥理分類	適應症	單張
ACETYLSALICYLIC ACID CAP 100MG BOKEY EM CAP 100MG 伯基樂得粒膠囊	CAP	1 N.S.A.I.D.s 切换成份和 AHFS藥理分類	Muscular and vascular pains, headache, dentalgia, arthritis, bursitis, rheumatoid arthritis, rheumatic fever, inflammatory joints condition. Fever and discomfort of cold, and as an anticoagulant (anti-thrombotic action)	
ETORICOXIB TAB 60MG ARCOXIA TAB 60MG 萬克樂錠 60公絲	TAB	N.S.A.I.D.s 點擊可取得同藥理藥品	Osteoarthritis (OA), Rheumatoid Arthritis (RA), Acute Gouty Arthritis and primary dysmenorrhea, Ankylosing spondylitis, Dental pain 骨質部炎(OA)與類風濕性關節炎(RA)之炎與症狀的急性性治療、治療慢性痛風性關節炎、治療原发性月經痛、治療慢性牙痛、治療牙科手術後疼痛、治療牙科手術後疼痛。	
FLUBIPROFEN TAB 100MG LEFENINE TAB 100MG 利群美腺錠	TAB	1 N.S.A.I.D.s	For the relief of the signs and symptoms of rheumatoid arthritis and osteoarthritis	
IBUPROFEN SUSPENSION 1.2G/60ML SCONIN SUSP 60ML 速熱寧口服懸液	SUSP	1 N.S.A.I.D.s	Ibuprofen is indicated for antipyretic and anti-inflammation use.	

藥碼	AK270
藥名	KETOROLAC INJ 30MG/1ML/AMP
英文商品名	KETO INJ 30MG 1ML
中文商品名	寬多美注射液
廠名	Ketorolac inj 30mg
劑型	INJS
規格	Inj 30 mg/ml
成分	
藥理分類	1 N.S.A.I.D.s → 點擊列出同AHFS藥品
健保碼	AC42412200 → 點擊連到衛福部藥品資訊
ATC碼	M01AB15 → 點擊列出同ATC藥品

適應症	Ketorolac is a non-steroidal anti-inflammatory agent with potent analgesic properties.
藥理	The predominant effect exhibited by ketorolac is analgesia rather than the anti-inflammatory effect exhibited by other NSAIDs. Ketorolac in equidose provides comparable analgesia to morphine, meperidine and other narcotic analgesics in the treatment of mild to moderate postoperative and postpartum pain.
藥動學	Elimination half-life 5-6 hr, via hepatic metabolism to inactive metabolites; renal excretion: 92%, 40% as metabolites, 60% as unchanged form
禁忌症	Hypersensitivity, allergy to aspirin or other anti-inflammatory agents; History of or active peptic ulcer disease; Advanced renal impairment; Labor/delivery; Nursing women; Preoperatively or intraoperatively for analgesia; Patients receiving aspirin or other nonsteroidal anti-inflammatory agents; Epidural or intrathecal route of administration; Concurrent use with probenecid; Suspected or confirmed cerebrovascular bleeding, hemorrhagic diathesis, incomplete hemostasis, and patients at high risk of bleeding. Total duration of parenteral and oral therapy should not exceed 5 days. Oral doses greater than 40 mg/day
懷孕分類	C
哺乳分類	Enters breast milk/ contraindicated
副作用	predominantly central nervous system and gastrointestinal adverse effects including somnolence, headache, dizziness, paresthesias, dry mouth, nausea, vomiting, abdominal pain, and dyspepsia. The IM injections occasionally cause local pain.
劑量和給藥方法	Adults: PO: 10 mg Q4-6 hr PRN, to a maximum of 40 mg/day for 5 days (including IM/IV). IM or IV 30 mg or 60 mg (IM only) once, then 15-30 mg Q6hr; Children: aged 1-18 years 1 mg/kg as a loading dose followed by 0.5 mg/kg Q6H for 48-72 hr.
安定性	Store at controlled room temperature 15 to 30 degrees C (59 to 86 degrees F) with protection from light

藥品外觀	
顏色	
形狀	
劑型	
標記1	
標記2	

藥品圖片



外觀圖片

藥品外觀

www.vghtc.gov.tw/080/pharmacyHandbook/handbook.html#/data/AK270

Enter's beast milk contraindicated

副作用 predominantly central nervous system and gastrointestinal adverse effects including somnolence, headache, dizziness, paresthesias, dry mouth, nausea, vomiting, abdominal pain, and dyspepsia. The IM injections occasionally cause local pain.

劑量及給藥方法 Adults: PO: 10 mg Q4-6 hr PRN to a maximum of 40 mg/day for 5 days (including IM/IV). IM or IV 30 mg or 60 mg (IM only) once, then 15-30 mg Q6 hr.
Children: aged 1-18 years 1 mg/kg as a loading dose followed by 0.5 mg/kg Q6H for 48-72 hr.

安定性 Store at controlled room temperature 15 to 30 degrees C (59 to 86 degrees F) with protection from light

---注射給藥指引---

給藥途徑	IV,IM
靜脈輸注液	D5W,NS, 0.9%GS, LR
每瓶稀釋液體積	
給藥速度	
給藥速率	IV bolus >15 秒
安定性	配製後 (室溫) 配製後 (冷藏) 稀釋後輸注後 (室溫) 稀釋後輸注後 (冷藏)
注意事項	1.勿與Demerol, Diazepam加在同一注射容器中，以免產生沉澱。2.使用期限不得超過5天(口服+注射劑型)，以免影響藥效。3.>55歲老人，腎功能不好，體重小於50 kg者，每次注射15 mg，每天總劑量不應超過60 mg。

---單位資訊---

臨床用途	疼痛之短期療法
主要副作用	輕微頭痛、腸胃不適、消化不良、頭暈、嗜睡、水腫等。
其他說明	本藥不屬於結構。

生效日期：2014-05-01

點擊圖片達到外部資料庫

健康維護 \$27.50
 仿單
 資料庫 Micromedex® 2.0
 UpToDate®
 健康給付規定
 及藥師專業建議表

多線諮詢：諮詢中心 電話: 04-22592525轉7038 email: mingde@vghtc.gov.tw
 內容諮詢：藥學部 電話: 04-22592525轉4629 email: mingde@vghtc.gov.tw
 本網以HTML為中藥代碼查詢所有 未經授權 禁止轉載

手機板畫面：

erpatient.vghtc.gov.tw/pharmacyHandbook/hand

藥品查詢關鍵字 AA 搜尋 重設
 查詢類別: 藥碼 學名 商品名 藥理 適應症

藥品查詢關鍵字 | 搜尋 重設
 查詢類別: 藥碼 學名 商品名 藥理 適應症

共 52 筆

	藥品學名: ACETAMINOPHEN TAB 0.5G 英文商品名: DEPYRETIN TAB 0.5G 中文商品名: 得百利寧錠 適應症: Analgesic and antipyretic actions similar to aspirin, no anti-inflammatory properties
	藥品學名: ACETAZOLAMIDE TAB 250MG 英文商品名: ACETAZOLAMIDE-250 中文商品名: 乙醯氨基磺坐噻錠 適應症: Acetazolamide is a useful adjunct to the therapy of open angle glaucoma, seizure, edema, and CHF. It has been used to prevent acute mountain sickness.
	藥品學名: ACIPIMOX CAP 250MG 英文商品名: OLBETAM CAP 250MG 中文商品名: 脂倍坦膠囊 適應症: Type IIa (elevated plasma levels of cholesterol), IIb, III, IV (elevated plasma levels of triglycerides), V (elevated plasma levels of cholesterol and triglycerides) hyperlipoproteinemia.
	藥品學名: ACYCLOVIR OPH. OINT 3% 4.5G 英文商品名: DEVIRUS OPH. OINT 中文商品名: 力克眼用軟膏 適應症: Treatment of herpes simplex infections in immunocompromised patients.
	藥品學名: EPINERPHINE INJ 1MG

藥碼	AA600
藥名	ASPARAGINASE INJ 5000KU
英文商品名	LEUNASE INJ 5000KU
中文商品名	樂拿舒注射劑
螢幕名	Leunase inj 5000ku 溶化
劑型	INJ
規格	Inj 5000KU/Vial. (1KU of L-asparaginase is equivalent to the amount of enzyme producing 1 ? mol ammonia for 1 minute from L-asparaginase under the condition of 37°C. 1KU=1IU)
成分	
藥理分類	1. Anticancer-Others
健保碼	B021036221
ATC碼	L01XX02

適應症	Acute lymphocytic leukemia, malignant melanoma, chronic myelocytic leukemia, acute myelocytic leukemia.
禁忌症	Pancreatitis, impaired liver function; test dose at the start of treatment to check for hypersensitivity.
懷孕分類	C
副作用	Hypersensitivity reactions and anaphylactic shock, anorexia, hypocholesterolaemia, hypoproteinaemia, somnolence, confusion, mild leukopenia, thrombocytopenia, hyperglycemia.
劑量和	200IU (or KU)/day IV, IM for 28 days, or 1000-6000 IU for 21 days for 5 days

14:35 14:37

外觀查詢系統

外觀查詢系統是透過口服藥品的外觀來查詢藥品名稱和資料的系統，方便醫護人員透過外觀來辨識藥品。選擇空白的話則代表忽略此項查詢。

臺中榮總藥品手冊查詢系統

[由藥品資料查詢](#) [由藥品外觀查詢](#) [非本院健保藥品查詢](#)

顏色：黃色 ▾ 形狀：圓球形 ▾ 別稱： ▾ 標記： 149

共 1 筆資料

藥品學名/中英文商品名	劑型	成分/藥理分類	適應症	藥圖
AZATHIOPRINE TAB 50MG ASAZIPAM TAB 50MG 安惠平 圓形 50毫克 	TAB	1. Anticancer-Purine Antimetabolites		

系統維護：臨濟中心 電話：(04)23592329 轉5839 email: mjn@td@vghtc.gov.tw
內容維護：藥學部 電話：(04)23592329 轉4639 email: gjm@td@vghtc.gov.tw
本網站內容為臺中榮民總醫院所有 未經授權 禁止轉載

健保藥品查詢系統

非本院健保藥品查詢是採用健保署的藥品資訊，在輸入商品名、健保碼、成份明的狀況下，可以查詢到健保藥品。點選許可證字號可以連到食品藥物管理數的資料。點選「院內同主 ATC 藥品」可透過 ATC 碼查詢本院有相同 ATC 的藥品。

臺中榮總查詢健保署健保藥品系統

英文藥名
健保碼

中文藥名
成分 aspirin

搜尋

共60筆資料(最多只顯示前200筆)

 健保碼：A003092100
許可證字號：[衛署藥製字第003092號](#)
英文藥名：ASPIRIN TABLETS 500MG "S.Y."
中文藥名：阿斯匹林錠 5 0 0 公絲
劑型：錠劑
規格：
起迄時間：084.03.01 ~ 迄今
其他功能：[院內同主ATC藥品](#)

 健保碼：A004813100
許可證字號：[衛署藥製字第004813號](#)
英文藥名：ASPIRIN TABLETS "VPP"
中文藥名：阿斯匹林錠
劑型：錠劑